

2022年

<p>1</p>	<p><math>a, b</math> を実数とする。</p> <p>(1) 整式 <math>x^3</math> を 2 次式 <math>(x-a)^2</math> で割ったときの余りを求めよ。</p> <p>(2) 実数を係数とする 2 次式 <math>f(x) = x^2 + \alpha x + \beta</math> で整式 <math>x^3</math> を割ったときの余りが <math>3x + b</math> とする。<math>b</math> の値に応じて、このような <math>f(x)</math> が何個あるかを求めよ。</p>
<p>2</p>	<p>1 つのサイコロを 3 回投げる。1 回目に出る目を <math>a</math>, 2 回目に出る目を <math>b</math>, 3 回目に出る目を <math>c</math> とする。なおサイコロは 1 から 6 の目が等しい確率で出るものとする。</p> <p>(1) <math>ab + 2c \geq abc</math> となる確率を求めよ。</p> <p>(2) <math>ab + 2c</math> と <math>2abc</math> が互いに素となる確率を求めよ。</p>
<p>3</p>	<p>複素数平面上に、原点 <math>O</math> を頂点の 1 つとする正六角形 <math>OABCDE</math> が与えられている。ただしその頂点は時計の針の進む方向と逆向きに <math>O, A, B, C, D, E</math> とする。互いに異なる 0 でない複素数 <math>\alpha, \beta, \gamma</math> が、</p> $0 \leq \arg\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \leq \pi, \quad 4\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = 0, \quad 2\gamma^2 - (3\alpha + \beta + 2)\gamma + (\alpha + 1)(\alpha + \beta) = 0$ <p>を満たし、<math>\alpha, \beta, \gamma</math> のそれぞれが正六角形 <math>OABCDE</math> の頂点のいずれかであるとする。</p> <p>(1) <math>\frac{\beta}{\alpha}</math> を求め、<math>\alpha, \beta</math> がそれぞれの頂点か答えよ。</p> <p>(2) 組 <math>(\alpha, \beta, \gamma)</math> をすべて求め、それぞれの組について正六角形 <math>OABCDE</math> を複素数平面上に図示せよ。</p>
<p>4</p>	<p>関数 <math>f(x)</math> は区間 <math>x \geq 0</math> において連続な増加関数で <math>f(0) = 1</math> を満たすとする。ただし <math>f(x)</math> が区間 <math>x \geq 0</math> における増加関数であるとは、区間内の任意の実数 <math>x_1, x_2</math> に対し <math>x_1 &lt; x_2</math> ならば <math>f(x_1) &lt; f(x_2)</math> が成り立つときをいう。以下、<math>n</math> は正の整数とする。</p> <p>(1) <math>\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2 - \frac{1}{n}} \frac{f(x)}{2-x} dx = \infty</math> を示せ。</p> <p>(2) 区間 <math>y &gt; 2</math> において関数 <math>F_n(y)</math> を <math>F_n(y) = \int_{2 + \frac{1}{n}}^y \frac{f(x)}{x-2} dx</math> と定めるとき、<math>\lim_{y \rightarrow \infty} F_n(y) = \infty</math> を示せ。また <math>2 + \frac{1}{n}</math> より大きい実数 <math>a_n</math> で</p> $\int_0^{2 - \frac{1}{n}} \frac{f(x)}{2-x} dx + \int_{2 + \frac{1}{n}}^{a_n} \frac{f(x)}{2-x} dx = 0$ <p>を満たすものがただ 1 つ存在することを示せ。</p> <p>(3) (2) の <math>a_n</math> について、不等式 <math>a_n &lt; 4</math> がすべての <math>n</math> に対して成り立つことを示せ。</p>