

## 2022年

1	<p><math>a, b</math> を実数とする。座標平面上の放物線 <math>y = x^2 + ax + b</math> を <math>C</math> とおく。<math>C</math> は、原点で垂直に交わる 2 本の接線 <math>\ell_1, \ell_2</math> を持つとする。ただし、<math>C</math> と <math>\ell_1</math> の接点 <math>P_1</math> の <math>x</math> 座標は、<math>C</math> と <math>\ell_2</math> の接点 <math>P_2</math> の <math>x</math> 座標より小さいとする。</p> <p>(1) <math>b</math> を <math>a</math> で表せ。また <math>a</math> の値はすべての実数をとることを示せ。</p> <p>(2) <math>i = 1, 2</math> に対し、円 <math>D_i</math> を、放物線 <math>C</math> の軸上に中心を持ち、点 <math>P_i</math> で <math>\ell_i</math> と接するものと定める。<math>D_2</math> の半径が <math>D_1</math> の半径の 2 倍となるとき、<math>a</math> の値を求めよ。</p>
2	<p><math>y = x^3 - x</math> により定まる座標平面上の曲線を <math>C</math> とする。<math>C</math> 上の点 <math>P(\alpha, \alpha^3 - \alpha)</math> を通り、点 <math>P</math> における <math>C</math> の接線と垂直に交わる直線を <math>\ell</math> とする。<math>C</math> と <math>\ell</math> は相異なる 3 点で交わるとする。</p> <p>(1) <math>\alpha</math> のとりうる値の範囲を求めよ。</p> <p>(2) <math>C</math> と <math>\ell</math> の点 <math>P</math> 以外の 2 つの交点の <math>x</math> 座標を <math>\beta, \gamma</math> とする。ただし、<math>\beta &lt; \gamma</math> とする。  <math>\beta^2 + \beta\gamma + \gamma^2 - 1 \neq 0</math> となることを示せ。</p> <p>(3) (2) の <math>\beta, \gamma</math> を用いて</p> $u = 4\alpha^3 + \frac{1}{\beta^2 + \beta\gamma + \gamma^2 - 1}$ <p>と定める。このとき、<math>u</math> のとりうる値の範囲を求めよ。</p>
3	<p>数列 <math>\{a_n\}</math> を次のように定める。</p> $a_1 = 4, \quad a_{n+1} = a_n^2 + n(n+2) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ <p>(1) <math>a_{2022}</math> を 3 で割った余りを求めよ。</p> <p>(2) <math>a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}</math> の最大公約数を求めよ。</p>
4	<p><math>O</math> を原点とする座標平面上で考える。0 以上の整数 <math>k</math> に対して、ベクトル <math>\vec{v}_k</math> を</p> $\vec{v}_k = \left( \cos \frac{2k\pi}{3}, \sin \frac{2k\pi}{3} \right)$ <p>と定める。投げたとき表と裏がどちらも <math>\frac{1}{2}</math> の確率で出るコインを <math>N</math> 回投げ、座標平面上に点 <math>X_0, X_1, X_2, \dots, X_n</math> を以下の規則 (i), (ii) に従って定める。</p> <p>(i) <math>X_0</math> は <math>O</math> にある。</p> <p>(ii) <math>n</math> を 1 以上 <math>N</math> 以下の整数とする。<math>X_{n-1}</math> が定まったとし、<math>X_n</math> を次のように定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>n</math> 回目のコイン投げで表が出た場合、  <math display="block">\vec{OX}_n = \vec{OX}_{n-1} + \vec{v}_k</math>           により <math>X_n</math> を定める。ただし、<math>k</math> は 1 回目から <math>n</math> 回目までのコイン投げで裏が出た回数とする。</li> <li>• <math>n</math> 回目のコイン投げで裏が出た場合、<math>X_n</math> を <math>X_{n-1}</math> と定める。</li> </ul> <p>(1) <math>N = 5</math> とする。<math>X_5</math> が <math>O</math> にある確率を求めよ。</p> <p>(2) <math>N = 98</math> とする。<math>X_{98}</math> が <math>O</math> にあり、かつ、表が 90 回、裏が 8 回出る確率を求めよ。</p>